

DERİ “ PRICK ” TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

TARİH:

1. Deri ‘prick’ testi (SPT: Skin Prick Test), yakınmaları bir solunum yolu ya da besin allerjisinin varlığını düşündüren olgularda uygulanan bir testtir. Gerektiğinde, derinin allerjik hastalıklarına tanı koyabilmek amacıyla da yapılabilir.
2. Test, solunum yolu ve besin allerjenleri , lateks, ya da besinlerle doğrudan (“fresh prick test”) uygulanmaktadır.
3. Yöntem, antijen deriye damlatıldıktan sonra, orta noktadan lansetle derinin hafifçe kaldırılıp bırakılması temeline dayanır. Değerlendirme 15 dakika sonra yapılmaktadır.
4. Uzman ellerde ve acil girişim için gerekli koşulların varlığında uygulanması hemen hiçbir zaman sorun oluşturmaz . SPT yıllardır bütün dünya ülkelerinde uygulanmakta olup , sistemik reaksiyon (deri döküntüsü, nefes darlığı, şok vb.) gelişen olgu sayısı çok azdır.
5. Olası riskler nedeniyle, SPT uygulaması sonrasında hastalar hiçbir yere ayrılmadan uygulama bölgesinde beklemelidirler .
6. Test bölgesinde gelişebilecek kızarıklık ve şişliklerin çoğu birkaç saat içinde tümüyle geriler . Bu tip reaksiyonların yaşamsal önemi yoktur.

ONAY:

Yukarıda yazılanları okudum. Deri “prick” testinin uygulanma biçimi, gerekliliği ve olası riskleri konusunda bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla SPT yapılmasını kabul ediyorum

SPT UYGULAMASININ ADI :

ADI, SOYADI,CİNSİYETİ,YAŞI:

ADI/ SOYADI (VELİSİ) :

İMZA :

TANIK (KLİNİK HEMŞİRESİ):

İMZA:

UYGULAMAYI YAPAN HEKİM:

İMZA:

OTOLOG SERUM DERİ TESTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

Tarih:

Size uygulayacağımız otolog serum deri testi (OSDT), kendi serumunuzun derinizde herhangi bir reaksiyon oluşturup oluşturmayacağını belirlemeye yöneliktir. Gelişebilecek bir reaksiyonun varolan (allerjik) hastalığınız ile ilişkili olma olasılığı vardır.

Damardan kan alınıp serumunuz ayrılacak, daha sonra ise kendi serumunuz çok az miktarda (0.05 ml) deri içine enjekte edilecektir. Kontrol için ise, 0.05 ml steril serum fizyolojik yine deri içine verilecektir. Yarım saat sonra serumunuzun uygulandığı yerde gelişecek bir kızarıklık ve kabarıklık pozitif olarak değerlendirilecektir. Bu süre içinde test yapılan yerden ayrılmamanız gereklidir.

Uygulamalar kendi serumunuz ve steril serum fizyolojik ile yapılacağından herhangi bir risk taşımamaktadır. Gelişebilecek kızarıklık birkaç saat içinde tümüyle gerileyecektir.

ONAY:

Yukarıda yazılanları okudum ve anladım. Otolog serum deri testinin uygulanma biçimi, gerekliliği ve olası riskleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla, otolog serum deri testi uygulanmasını kabul ediyorum.

Hastanın Adı / Soyadı:

İmza:

Tanığın (Klinik Hemşiresi) Adı / Soyadı:

İmza:

Uygulamayı Yapan Hekim:

İmza:

İNTRADERMAL TEST HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

TARİH:

1. İntradermal test (IDT), kliniğimizde solunum yolu allerjenleriyle yapılan rutin deri testi (SPT: Skin Prick Test) sonuçları negatif olan, yani herhangi bir reaksiyon görülmeyen; ancak yakınmaları solunum yolu allerjisi varlığını düşündüren hastalara uygulanan bir tanısal girişimdir.
2. Yöntem, belli konsantrasyonlarda dilüe edilmiş solunum yolu allerjenlerinin (ev tozu akar antijeni, polen antijenleri vb.) enjektörle doğrudan deri içine verilmesine dayanır.
3. Testten bir hafta önce; oral antihistamin, sistemik steroid, beta-blokör ve ACE inhibitörü kullanımının kesilmiş olması gereklidir.
4. Ender de olsa, sistemik reaksiyonlar (ürtiker, yaygın kaşıntı, ateş basması, nefes darlığı, hırıltılı solunum, şok vb.) gelişebilmektedir. Bu nedenle, IDT uzman ellerde ve acil girişim için gerekli koşulların varlığında uygulanacaktır.
5. Şiddetli nefes darlığı başta olmak üzere allerjik yakınmaların alevlendiği durumlarda, yaygın ürtiker ya da ateşli hastalıkların varlığında IDT uygulanmaz.
6. IDT uygulaması sonrasında, hastalar uygulama bölgesinden hiçbir yere ayrılmadan yarım saat beklemelidirler.
7. Test bölgelerinde, ender olarak, uygulamadan 3-6 saat sonra başlayıp, 24-48 saat süren reaksiyonlar gelişebilir. Bu tip reaksiyonların da kliniğimize bildirilmesi uygun olur (Tel:)

ONAY:

Yukarıda yazılanları okudum ve anladım. İntradermal deri testinin uygulanma biçimi, gerekliliği ve olası riskleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla, solunum yolu allerjenleriyle intradermal deri testi uygulanmasını kabul ediyorum.

ADI, SOYADI, CİNSİYETİ, YAŞI:

ADI, SOYADI (VELİSİ) :

İMZA :

TANIK (KLİNİK HEMŞİRESİ):

İMZA:

UYGULAMAYI YAPAN HEKİM:

İMZA:

ATOPI YAMA TESTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

TARİH:

1. Atopi yama testi (AYT), atopik dermatitte solunum yolu allerjenleri (ev tozu akarları, polenler vb.) ve/veya besin allerjenlerinin (süt, yumurta, un vb.) rol oynayıp oynamadığına ilişkin bir görüş oluşturabilmek için yapılmaktadır.
2. Yöntem vazelin içinde hazırlanmış ya da kurutma kağıdına emdirilmiş solunum yolu allerjenlerinin ya da (çoğu kez tüketildiği biçimiyle) besinlerin doğrudan özel bantlarla sırtta yapıştırılmasına dayanır.
3. Uygulamadan 30 dk. sonra test bölgesi kontrol edilir. Yaygın kızarıklık ya da kaşıntı olursa, bantlar sırttan uzaklaştırılır.
4. Test bantları sırtta 48 saat süreyle kalacaktır. Bu nedenle, bantların ayrılmaması için 48 saat süreyle banyo yapılmaması ve aşırı fiziksel etkinlikte bulunulmaması uygun olacaktır.
5. Testin yaşamsal tehlikesi yoktur. Uygulama bölgesinde yaygın kızarıklık, kabarıklık ve kaşıntı olursa, bantlar uzaklaştırılıp kliniğimize bilgi verilecektir (Tel:).
6. Değerlendirme 48. saatte, bantlar sırttan uzaklaştırıldıktan 30 dk. sonra yapılacaktır. Gerekirse 72. saatte, test bölgesi bir kez daha kontrol edilebilir.

-
ONAY:

Yukarıda yazılanları okudum ve anladım. Atopi yama testinin uygulanma biçimi, gerekliliği ve olası riskleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla atopi yama testi uygulanmasını kabul ediyorum.

ADI, SOYADI, CİNSİYETİ, YAŞI:

ADI, SOYADI (VELİSİ) :

İMZA :

TANIK (KLİNİK HEMŞİRESİ):

İMZA:

UYGULAMAYI YAPAN HEKİM:

İMZA:

YAMA TESTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

TARİH:

1. Yapılan muayene sonucunda size “allerjik kontakt dermatit” (temas ekzeması) tanısı konulmuştur. Yama testi bu hastalığınıza neden olabilecek maddeleri saptamak amacıyla uygulanan bir tanısal yaklaşımdır.
2. Yöntem vazelin içinde hazırlanmış ya da hazır halde özel bantlara emdirilmiş olarak bulunan antijenlerin (temas dermatitine neden olabilecek kimyasal ürünlerin) doğrudan sırtta yapıştırılmasına dayanır. Bazen de sık kullandığınız ve hastalığınıza neden olabileceği düşünülen giysiler, evde kullanılan ya da kozmetik ürünler gibi maddeler yine doğrudan, ya da sulandırılarak sırtınıza uygulanmaktadır.
3. Test bantları sırtta 48 saat süreyle kalacaktır. Bu nedenle, bantların ayrılmaması için 48 saat süreyle banyo yapılmaması ve aşırı fiziksel etkinlikte bulunulmaması uygun olacaktır.
4. Testin yaşamsal tehlikesi yoktur. Bazen uygulama bölgesinde kaşıntı, sivilce gelişimi ve hafif renk değişikliği olabilir. Çok düşük olasılıkla, ekzema alevlenmesi, uygulama bölgesinde aşırı tahriş ve yanma olabilir. Uygulama bölgesinde iz kalma olasılığı da çok düşüktür. Materyallerin çok ender de olsa sızma ve iç çamaşırınızı hafif boyama olasılığı vardır. Herhangi bir şiddetli yakınma olduğunda, bantlar uzaklaştırılıp kliniğimize bilgi verilecektir (Tel:.....).
5. Değerlendirme 48. saatte, bantlar sırttan uzaklaştırıldıktan 30 dakika sonra yapılacaktır. 72 ve 96. saatlerde, gerekirse bir hafta sonra test bölgeleri kontrol edilecektir.

-
ONAY:

Yukarıda yazılanları okudum ve anladım. Yama testinin uygulanma biçimi, gerekliliği ve olası riskleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla yama testi uygulanmasını kabul ediyorum.

ADI, SOYADI,CİNSİYETİ,YAŞI:

ADI, SOYADI (VELİSİ) :

İMZA :

TANIK (KLİNİK HEMŞİRESİ):

İMZA:

UYGULAMAYI YAPAN HEKİM:

İMZA:

FOTO YAMA TESTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

TARİH:

1. Yapılan muayene sonucunda güneş ışınlarıyla alevlenen bir deri hastalığınızın varolduğu saptanmıştır. Foto yama testi bu hastalığınıza neden olabilecek maddeleri saptamak amacıyla uygulanan bir tanısal yaklaşımdır.
2. Yöntem vazelin içinde hazırlanmış standart antijenlerin (hastalığınıza neden olabilecek kimyasal ürünlerin) simetrik ve iki taraflı olarak doğrudan sırtta yapıştırılmasına dayanır.
3. Test bantları hiç ışıkla karşılaşmadan sırtta 48-96 saat süreyle kalacaktır. Bu nedenle, bantların ayrılmaması için banyo yapılmaması ve aşırı fiziksel etkinlikte bulunulmaması uygun olacaktır.
6. İkinci gün sonunda sırtın bir yanındaki bant kaldırılıp değerlendirilecek, daha sonra ışınlanıp kapatılacaktır. İki gün daha beklendikten sonra, bantlar sırttan uzaklaştırılacak ve işlem bitmiş olacaktır. Testin yaşamsal tehlikesi yoktur. Bazen uygulama bölgesinde kaşıntı, sivilce gelişimi ve hafif renk değişikliği olabilir. Çok düşük olasılıkla, ekzema alevlenmesi, uygulama bölgesinde aşırı tahriş ve yanma olabilir. Uygulama bölgesinde iz kalma olasılığı da çok düşüktür. Herhangi bir şiddetli yakınma olduğunda, bantlar uzaklaştırılıp kliniğimize bilgi verilecektir (Tel:.....).

-
ONAY:

Yukarıda yazılanları okudum ve anladım. Foto yama testinin uygulanma biçimi, gerekliliği ve olası riskleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla foto yama testi uygulanmasını kabul ediyorum.

ADI, SOYADI, CİNSİYETİ, YAŞI:

ADI, SOYADI (VELİSİ) :

İMZA :

TANIK (KLİNİK HEMŞİRESİ):

İMZA:

UYGULAMAYI YAPAN HEKİM:

İMZA:

